



Banvel



Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima.

Sastav:	Dikamba - sol (480 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za otopinu (SL).
Opis pripravka:	Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima. Zbog vrlo povoljnog toksikološkog i ekološkog profila, unatoč već dugom prisustvu na tržištu, Banvel 480 SC je i dalje jedan od najprodavanijih herbicida za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.
Način djelovanja:	Banvel 480 S se uglavnom adsorbira preko lista, manjim dijelom i preko korijena. Djelatna tvar se nakon ulaska u biljku jako dobro kreće i uzlaznim i silaznim tokovima te se vrlo brzo raspoređuje u točke rasta kako u nadzemnim tako i u podzemnim dijelovima što omogućava i djelovanje na podzemne organe višegodišnjih korova. Djelatna tvar u biljci djeluje poput hormona rasta te izaziva nekontroliran i nekoordiniran rast uz prerastanak izduživanja i zadebljanja korijena. Te promjene dovode do ugibanja cijele biljke. Aktivnost djelatne tvari se pojačava sa porastom temperature.
	Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: jednogodišnji i dvogodišnji: bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>), pepeljuga (<i>Atriplex patula</i>), samonikli suncokret (<i>Helianthus annuum</i>), dvornici (<i>Polygonum</i> spp.), šćirevi (<i>Amaranthus</i> spp.), poljska gorušica (<i>Sinapsis arvensis</i> , dikica (<i>Xanthium strumarium</i>), limundžik (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>), europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>). Višegodišnji korovi: osjak (<i>Cirsium arvense</i>), slak (<i>Convolvulus arvensis</i>), ladolež (<i>Calystegia sepium</i>), štavelj (<i>Rumex</i> spp.), divlja kupina (<i>Rubus caesius</i>).

Primjena:	U kukuruza za zrna i silažu (bez podusjeva), u količini od 0,5–0,7 l/ha (50–70 ml na 1000 m²). Primjenjuje se poslije nicanja, kada kukuruz razvije 3–5 listova po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25–30 cm uz međurednu kultivaciju. Na strništima na kojima neće biti sjetve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova: osjaka (<i>Cirsium</i> spp.), svinjka (<i>Sonchus</i> spp.), slakova (<i>Convolvulus</i> spp.) i dr. u količini od 1–1,5 l/ha (100–150 ml na 1000 m²), u vrijeme cvatnje korova.
Miješanje:	Banvel 480 S je moguće miješati sa većinom drugih herbicida u kukuruzu.
Upozorenja:	Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke isparljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne širokolisne usjeve (repu, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i nasade. Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana.
Karenca:	Za silažni kukuruz iznosi 70 dana. Osigurana je vremenom i načinom primjene za kukuruz za zrna. Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/04-01/186.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	200 ml, 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Banvel 480 S

- [PDF](#) (568 KB)