

**Lintur®****syngenta**

Lintur 70 WG je kombinirani herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u strnim žitaricama.

Sastav: Dikamba (659 g/kg) i triasulfuron (41 g/kg).

Formulacija: Moćive granule (WG).

Opis pripravka: Lintur 70 WG je kombinirani herbicid sastavljen od djelatnih tvari dikambe i triasulfurona koje se usvajaju i preko lista i preko korijena. Lintur 70 WG djeluje na najvažnije širokolistne korove u strnim žitaricama, **kako jednogodišnje tako i višegodišnje**.

Način djelovanja: Obje djelatne tvari se mogu usvajati putem lista, a triasulfuron se u značajnoj mjeri može usvajati i korijenovim sustavom i na taj način **ostvaruje duže rezidualno djelovanje preko tla**, suzbijajući ponik korova i nakon aplikacije. Dikamba se također može usvajati preko korijena, ali u znatno manjoj mjeri nego preko lista korova. Triasulfuron ostvaruje svoj herbicidni učinak sprečavanjem rasta korova, dok dikamba djeluje kao tipični hormonski herbicid izazivajući nekontroliran rast i deformacije korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu od fenofaze tri lista, pa do kraja busanja (fenofaze 13-29 po decimalnoj ZCK skali).

Prskati se može u jesen ili u proljeće, kada korovi nisu veći od 4 lista ili rozeta do 5 cm promjera, pri temperaturi koja nije niža od 10°C, a optimum je kod 18-25°C.

Sredstvo se u ozimoj pšenici i ječmu koristi u količini od 0,18 kg/ha, a u jaroj pšenici i ječmu u količini 0,12 kg/ha i uz utrošak škropiva 100-300 l/ha. Lintur 70 WG odlično suzbija kamilicu (*Matricaria spp*), mrtvu koprivu (*Lamium spp*), mišjakinju (*Stellaria media*), poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*), samonikle repice, grahorice (*Vicia*

Primjena:

spp.) i druge jednogodišnje širokolisne korove dok od širokolisnih uspješno rješava problem poljskog osjaka (*Cirsium arvense*), poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*). Na priljepaču (*Galium aparine*) postiže dobro djelovanje ukoliko biljke priljepače u vrijeme primjene nisu imale više od 6 lisnih pršljenova.

Miješanje: Ne preporuča se miješanje sa insekticidima. U slučaju potrebe miješanja sredstva preporuča se izvršiti probu na mogućnost miješanja i fitotoksičnost.

Upozorenja: Ne koristiti na površinama sa stagnirajućom vodom. Preparat ne koristiti na tlima čiji je pH (u KCl) iznad 7,0 na laganim tlima i na erozivnim tlima (kosim površinama). Kod rada treba spriječiti zanošenje sredstva na susjedne usjeve. Zbog visoke osjetljivosti ne tretirati u neposrednoj blizini nasada šuma, duhana, repe i suncokreta. U slučaju preoravanja može se sijati samo kukuruz. Kao postrni usjev mogu se sijati kukuruz i žitarice. U jesen se smiju sijati ozima uljana repica i žitarice.

Karenca: Osigurana vremenom primjene.

Podaci o registraciji: UP/I-320-20/03-01/177.

Prilog: Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.

Važno: Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje: 150 g, 1 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Lintur 70WG

- [PDF \(607 KB\)](#)