

Teridox®

Teridox 500 EC je herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.

Sastav:	Dimetaklor (500 g/l).
Formulacija:	Koncentrat za emulziju (EC).
Opis pripravka:	Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje korova u uljanoj repici.
Način djelovanja:	Teridox 500 SC djeluje preko tla pa ga korovne biljke usvajaju preko korijena i koleoptile. U biljkama sprečava diobu stanica i daljnji rast biljke. Djeluje na korove u nicanju ili već iznikle korove u mlađim razvojnim stadijima. Djeluje na uskolisne i širokolisne korovske vrste.
Primjena:	Teridox 500 SC upotrebljava se kao zemljišni herbicid u uljanoj repici za suzbijanje sljedećih korova: kamilice (<i>Matricaria</i> spp.), koštana (<i>Echinochloa crus-galli</i>), mišjeg repka (<i>Alopecurus myosuroides</i>), slakoperke (<i>Apera spica-venti</i>), jednogodišnje vlasnjače (<i>Poa annua</i>), pastirske torbice (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), bijele lobode (<i>Chenopodium album</i>), mrtve koprive (<i>Lamium purpureum</i>), jarmena (<i>Anthemis arvensis</i>), mišjakinje (<i>Stellaria media</i>), čestoslavice (<i>Veronica persica</i>) i drugih. Teridox 500 SC se na istoj površini smije primjeniti svake treće godine: - neposredno nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2 l/ha, - nakon nicanja u količini od 2 l/ha u stadiju razvoja uljane repice od 2-4 lista. Travne korove najbolje suzbija u nicanju do pojave prvog lista, a širokolisne u stadiju kotiledona do pojave prvog para listova. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak od 200 – 400 l vode/ha.
Miješanje:	Praksa ukazuje da se za potpuni učinak na priljepaču (<i>Galium aparine</i>) Teridox 500 EC može miješati u

pre-em roku sa herbicidima na osnovi klomazona.

Upozorenja:

Teridox 500 SC se smije na istoj površini koristiti najviše jednom u tri godine. Kod grube pripreme tla i neujednačene sjetve, kada sjeme repice nije dobro pokriveno tlom može doći do fitotoksičnosti. Sjeme repice treba biti pokriveno s 1,5 – 2,5 cm tla. Ne koristiti preparat na lakim pješčanim tlima na kojima je povećan rizik od ispiranja u podzemne vode. Prilikom primjene sredstva nakon nicanja uljane repice, dopušteno je primijeniti Teridox 500 EC samo u jesen. U slučaju preoravanja, u proljeće se može sijati kukuruz i soja.

Karenca:

Osigurana vremenom primjene.

Podaci o registraciji:

UP/I-320-20/05-01/116.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

1 l, 5 l.

Napomena:

Izmjena rješenja o dozvoli za promet. Za detaljnije informacije kliknite na važne obavijesti iz zakonodavstva.

Sigurnosno - tehnički list

Teridox 500 EC

- [PDF](#) (499 KB)