

Fungicid




Ortiva Top je fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi.

Ortiva Top

Sastav:	Azoksistrobin (200 g/l) + difenkonazol (125g/l).
Formulacija:	Koncentrat za suspenziju (SC).
Opis pripravka:	Ortiva Top je fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi.
Način djelovanja:	Obje djelatne tvari (azoksistrobin i difenkonazol) imaju osobine sistemskih fungicida koji se kreću translaminarno i uzlazno provodnim snopovima u biljci. Azoksistrobin djeluje inhibitorno na proces disanja, a difenkonazol ometa sintezu sterol u stanicama fitopatogenih gljivica. Zahvaljujući dvostrukom načinu djelovanja Ortiva Top nudi vrhunsku zaštitu u najpovoljnijim uvjetima za razvoj velikog broja biljnih bolesti. a) U rajčici (na otvorenom) za suzbijanje koncentrične pjegavosti (<i>Alternaria solani</i>), plamenjače (<i>Phytophthora infestans</i>) i pepelnice (<i>Leveillula taurica</i>) u količini od 0,8-1,0 l/ha. Više količine sredstva preporučuju se primijeniti kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Sredstvo je najbolje primijeniti preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 8 dana između primjena. Preporučeni utrošak vode je 500-1000 l/ha; b) Mrkvi za suzbijanje pepelnice (<i>Erysiphe heraclei</i>), paleži lišća (<i>Alternaria dauci</i>) i crne pjegavosti korijena (<i>Alternaria radicina</i>) u količini od 0,8-1,0 l/ha. Više

količine sredstva preporučuju se primijeniti u slučajevima jačih zaraza ili kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 8 dana između primjena. Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha;

c) Patlidžanu za suzbijanje pepelnice (*Leveillula taurica*) u količini od 0,8-1,0 l/ha. Više količine sredstva preporučuju se primijeniti u slučajevima jačih zaraza ili kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 8 dana između primjena. Preporučeni utrošak vode je 500-1000 l/ha;

d) Glavatom kupusu, kelju i kelju pupčaru za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria brassicae*, *A. brassicicola*), prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*), bijele hrđe (*Albugo candida*) i pepelnice (*Erysiphe cruciferarum*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u početnim fazama razvoja bolesti odnosno kada se primijete prvi simptomi. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 8 dana između primjena. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha;

e) Cvjetači i brokuli za suzbijanje koncentrične pjegavosti (*Alternaria brassicae*, *A. brassicicola*), prstenaste pjegavosti (*Mycosphaerella brassicicola*) i bijele hrđe (*Albugo candida*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u početnim fazama razvoja bolesti odnosno kada se primijete prvi simptomi. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 8 dana između primjena. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha;

f) Luku i češnjaku (samo za proizvodnju glavica) za suzbijanje purpurne pjegavosti (*Alternaria porri*) i hrđe (*Puccinia allii*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u početnim fazama razvoja bolesti odnosno kada se primijete prvi simptomi. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha. Zabranjena je uporaba na mladom luku i mladom češnjaku;

g) Poriluku za suzbijanje purpurne pjegavosti (*Alternaria porri*) i hrđe (*Puccinia allii*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u početnim fazama razvoja bolesti odnosno kada se primijete prvi simptomi. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha;

h) Luku vlasu za suzbijanje purpurne pjegavosti (*Alternaria porri*) i hrđe (*Puccinia allii*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u početnim fazama razvoja bolesti odnosno kada se primijete prvi simptomi. Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom

Primjena:

	vegetacije. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha; i) Šećernoj repi za suzbijanje sive pjegavosti (<i>Cercospora beticola</i>) u količini od 0,5-0,8 l/ha i za suzbijanje pepelnice (<i>Erysiphe betae</i>) u količini od 0,8-1 l/ha. Više količine sredstva preporučuju se primijeniti u slučajevima jačih zaraza ili kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Sredstvo se primjenjuje preventivno ili kada se primijete prvi simptomi bolesti, u skladu s modelima prognoze ili preporukama savjetodavne službe. Dozvoljene su maksimalno dvije primjene tijekom jedne vegetacije, uz razmak od 21 dan između primjena. Preporučeni utrošak vode je 300-500 l/ha
Miješanje:	Kod primjene pripravka Ortiva Top u zaštićenim prostorima ne preporuča se dodavanje drugih sredstava za zaštitu bilja. Pripravak se na otvorenom može miješati s pripravcima REVUS, SHIRLAN, DACONIL 750 SC, SCORE 250 EC, ACTARA 250 WG, KARATE ZEON, RIDOMIL GOLD MZ, SWITCH. Ne preporučuje se miješanje sa ovlaživačima, mineralnim uljima, folijarnim gnojivima te sistemskim insekticidima EC formulacije.
Upozorenja:	Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene treba izbjegavati zanošenje škropiva na susjedne kulture.
Karenca:	Karenca: 21 dan za šećernu repu, luk (samo za proizvodnju glavica), češnjak (samo za proizvodnju glavica), poriluk, luk vlasac, cvjetaču, brokulu, bijeli kupus, crveni kupus, kupus, kelj pupčar i kelj; 14 dana za mrkvu; 7 dana za rajčicu i patlidžan.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/12-01/58
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno – tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obvezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	500 ml.

Sigurnosno tehnički list

STL_Ortiva Top

- [PDF](#) (595 KB)