



Pergado F[®]



Pergado F je sistemski fungicid za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.

Sastav:	Mandipropamid (50 g/l) + folpet (400 g/l).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	Kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.
Način djelovanja:	Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz njih postupno premješta i ulazi u biljni organ premještajući se i do suprotne, netretirane strane lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje. Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije. Pergado F ometa biosintezu fosfolipida te jena taj način suzbija bolesti biljaka. Folpet pruža površinsku zaštitu od infekcija sa najvažnijim uzročnicima bolesti u vinovoj lozi uz iznimku pepelnice. Folpet kao fungicid nespecifičnog mjesta djelovanja omogućava dobru zaštitu od pojave rezistencije plamenjače na mandipropamid. Osim na plamenjaču folpet osigurava djelovanje i na crnu pjegavost te popratno djelovanje na sivu plijesan.
Primjena:	Za suzbijanje plamenjače vinove loze (<i>Plasmopara viticola</i>) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m²). Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.
Miješanje:	Sredstvo se radi proširenja spektra može miješati sa fungicidima za suzbijanje pepelnice, sive plijesni ili sa insekticidima protiv grozdovih moljaca.

Upozorenja:	Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.
Karenca:	35 dana za stolne sorte i 42 dana za vinske sorte vinove loze.
Podaci o registraciji:	UP/I-320-20/06-01/278.
Prilog:	Uputa za primjenu, sigurnosno-tehnički list.
Važno:	Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.
Pakiranje:	1 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Pergado F

- [PDE](#) (528 KB)