



Pergado MZ[®]



Pergado MZ je fungicid za suzbijanje plamenjače na vinovoj lozi, krumpiru, rajčici, krastavcima i duhanu.

Sastav:	Mandipropamid (50 g/l) + mankozeb (600 g/l).
Formulacija:	Močive granule (WG).
Opis pripravka:	Pergado MZ je kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem na plamenjače.
Način djelovanja:	Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz biljne organe postupno premješta na netretiranu stranu lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje. Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije. Na gljivice djeluje negativno putem ometanja biosinteze fosfolipida. Djelatna tvar mankozeb djeluje površinski te sprečava pojavu infekcije djelujući na više mjesta u fiziologiji gljivica i zahvaljujući tome je odličan partner mandipropamidu zbog sprečavanja pojave rezistentnosti plamenjače, ali i zbog proširenja spektra na neke druge bolesti. U vinovoj lozi za suzbijanje plamenjače vinove loze (<i>Plasmopara viticola</i>) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana. U krumpiru za suzbijanje krumpirove plijesni (<i>Phytophthora infestans</i>) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana. U rajčici za suzbijanje plamenjače rajčice (<i>Phytophthora infestans</i>) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana. U krastavcima za suzbijanje plamenjače krastavaca

(*Pseudoperonospora cubensis*) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

U duhanu za suzbijanje **plamenjače duhana** (*Peronospora tabacina*) u količini od 2,5 kg/ha u razmacima od 7-10 dana.

Male kulture i male namjene

Primjena:

1) dinja (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje plamenjača (*Pseudoperonospora cubensis*) u dozi od 2-2,5 kg/ha uz utrošak 10 l vode/100 m². S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana. **2) salata** (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje plamenjača (*Pseudoperonospora cubensis*) u dozi od 2-2,5 kg/ha uz utrošak 10 l vode/100 m². S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije na otvorenom prostoru u razmaku od 7-10 dana. U zaštićenom prostoru dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.

KARENCA: Za dinju iznosi 5 dana, a za salatu iznosi 21 dan.

OGRANIČENJA: Ovaj proizvod se mora primijeniti u skladu s uvjetima ovog odobrenja, etiketi sredstva i / ili popratnog lista.

Miješanje:

Sredstvo se može miješati s većinom insekticida i fungicida u navedenim kulturama.

Upozorenja:

Može se koristiti najviše tri puta u vegetaciji. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca:

7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru) i krumpir; 14 dana za rajčicu; 21 dan za duhan i stolne sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze. Za kombinacije sa sumporom 56 dana za vinovu lozu.

Podaci o registraciji:

UP/I-320-20/06-01/279.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosno – tehnički list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

1 kg, 5 kg.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Pergado MZ

- [PDF](#) (496 KB)