



Quadris je fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze.

Sastav:	Azoksistrobin (250g/l).
Formulacija:	Koncentrirana suspenzija (SC).
Opis pripravka:	Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (<i>Uncinula necator</i>) i plamenjače (<i>Plasmopara viticola</i>) vinove loze.
Način djelovanja:	Djelatna tvar azoksistrobin kreće se translaminarno i sistemичno kroz provodne snopove po čitavoj biljci. Inhibitorno djeluje na proces disanja fitopatogenih gljivica. Postiže snažno preventivno djelovanje i treba ga primjenjivati prije nastalih infekcija.

QUADRIS se primjenjuje folijarnim prskanjem za suzbijanje:

plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*) i **pepelnice vinove loze** (*Uncinula necator*) u koncentraciji 0,1% sa 1000 l škropiva /ha, odnosno u količini od 1 l/ha pri čemu utrošak količine škropiva određuje bujnost i razvijenost biljke. Zaštitu je potrebno provoditi nakon cvatnje u vrijeme formiranja i debljanja bobica isključivo za preventivna tretiranja, uz potrošnju od 1000 l/ha vode. Kod visokih dnevnih temperatura prskanje treba provoditi ili u ranim jutarnjim ili ranim večernjim satima.

Male kulture i male namjene

1) Cucurbitaceae - krastavac lubenica, dinja, buča za suzbijanje

- plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*, rod *Didymella*) u koncentracij od 0,075% - 0,1%.
 - pepelnice (*Erisiphe orontii*, *Sphaeroteca fusca*, *Sphaeroteca fuliginea*) u koncentracij od 0,075%.
- S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili

kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

2) Cikla za suzbijanje pjegavosti lista (*Cercospora beticola*) u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana.

3) Hren za suzbijanje bijele hrđe (*Albugo candida*), lisne pjegavosti (*Alternaria* spp.) i plamenjače (*Peronospora brassicae*) u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7-10 dana.

4) Luk, češnjak, luk kozjak/ljutika, luk vlasac za suzbijanje plamenjače (*Peronospora destructor*) i u poriluku za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora porri*) i pjegavosti lišća (*Alternaria porri*) u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

5) Mrkva za suzbijanje paleži lišća mrkve (*Alternaria dauci*) u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

6) Patlidžan za suzbijanje *Alternaria* spp, *Phytophthora* spp i pepelnice (*Leveillula taurica*) u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

7) Jagoda za suzbijanje pepelnice (*Sphaerotheca macularis*) u dozi od 0,8-1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

10) Ukrasno bilje za suzbijanje pepelnice i hrđe u dozi od 1 l/ha. S primjenom započeti na prve znakove infekcije ili kada su uvjeti povoljni za razvoj bolesti. Dozvoljene su najviše četiri primjene tijekom jedne vegetacije u razmaku od 7 dana.

KARENCA: Za krastavace, lubenice, dinje, buče,

Primjena:

patlidžan i jagode iznosi 3 dana, za hren iznosi 10 dan, za luk, češnjak, luk kozjak/ljutika, luk vlasac, poriluk i mrkvu iznosi 14 dana i za ciklu iznosi 35 dana,

OGRANIČENJA: Ne tretirati po vrućem i vjetrovitom vremenu. U kulturama gdje je dozvoljena primjena više puta godišnje ne primjenjivati sredstvo više od dva puta za redom.

Spo-Ako se koristi leđna prskalica obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom.

Miješanje:

O mogućnostima miješanja sredstva QUADRIS s drugim sredstvima za zaštitu bilja, raspitajte se kod proizvođača i/ili zastupnika.

Upozorenja:

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije, u razmacima 10-14 dana. Ne smije se upotrebljavati pri vrućem i vjetrovitom vremenu (temperatura iznad 30 °C i brzina vjetra iznad 5 m/s).

Karenca:

35 dana za vinovu lozu.

Podaci o registraciji:

Rješenje MPRRR RH: Klasa br.: UP/I-320-20/08-01/96.

Prilog:

Uputa za primjenu, sigurnosni list.

Važno:

Prije uporabe obavezno pročitajte upute za primjenu.

Pakiranje:

100 ml; 200 ml i 1 l.

Sigurnosno - tehnički list

STL_Quadris

- [PDF](#) (582 KB)