

 Zaštita celera	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Nakon sjetve, prije nicanja nakon nicanja – 2-3 tjedna nakon sadnje sadnica	AFALON DISPERZIJA* ILI LINUREX 50 SC **	1,35 l/ha 1 – 2 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
	Prije nicanja	GOLTIX 70 WG *	5 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
	do 3 dana poslije sadnje biljaka	RACER 25 EC **	2 – 3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC **	0,5 – 1,5 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	INSEKTICIDI			
	U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	0,1 – 0,2 l/ha	Mrkvina muha, sovice, sovica gama
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU