

 Zaštita duhana	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Prije presađivanja uz inkorporaciju, te nakon presađivanja usmjerenim prskanjem u međuredove (štitnik) početak cvatnje, nakon odstranjivanja vrhova	PENDIGAN 330 EC	4 – 6 l/ha 4 l/ha 20 ml škropiva/ biljci	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi suzbijanje zaperaka (Burley i Virginia)
	Nakon nicanja	LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	INSEKTICIDI			
	Prije rasađivanja	PYRINEX 48 EC	6 - 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
	U vegetaciji prema potrebi		1,5 l/ha	Sovice pozemljuše**, lisne uši **
	Nakon nicanja rasada	KOHINOR 200 SL	0,25 – 0,5 l/ha	Lisne uši (zelena breskvina)
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU