

 Zaštita kelja i kelja pupčara	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	UZGOJ PRIJESADNICA			
	UZGOJ U POLJU			
	HERBICIDI			
	Prije presađivanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ** ILI	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm)
		LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha	travni korovi
	INSEKTICIDI			
	Prije sjetve	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom 3 l/ha u trake	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovci, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
u doba leta muhe i odlaganja jaja	PYRINEX 48 EC **	0,1% – prskanje ili zalijevanje s 70 ml škropiva/biljci ili 5 l škropiva na 30 m reda	Kupusna muha	
OSTALO				
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima	

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU