

		FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
 Zaštita kupusa	UZGOJ PRIJESADNICA				
	UZGOJ U POLJU				
	HERBICIDI				
	Prije presađivanja	GALIGAN 240 EC	1,5 – 2,5 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki višegodišnji korovi	
	Prije presađivanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi	
	Nakon nicanja, 5 listova do formiranja glavice – samo površine korištene za sjemensku proizvodnju	TOMIGAN 250 EC **	0,8 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ** ILI	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi	
		LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha		
	INSEKTICIDI				
	Prije sjetve	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom 3 l/ha u trake	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo	
	u doba leta muhe i odlaganja jaja	PYRINEX 48 EC **	0,1% – prskanje ili zalijevanje s 70 ml škropiva/biljci ili 5 l škropiva na 30 m reda	Kupusna muha	
	kod pojave prvih oštećenja		1 – 2 l/ha	Lisne uši, gusjenice – male vrste, Sovice pozemljuše	
Kod pojave prvih znakova napada, ponoviti za 10-14 dana	LAMDEX 5 EC **	0,1 l/ha 0,2 l/ha	Gusjenice Bijela mušica		
U rasadu, nakon presađivanja i u vegetaciji – 5 listova do formiranja glavice	KOHINOR 200 SL	1 l/ha	Kupusne lisne uši, lisne sovce		
OSTALO					
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima		

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU