

	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
 Zaštita luka	HERBICIDI			
	Iz sjemena	GALIGAN 240 EC	1 l/ha – 2 lista 1,5 l/ha – 3-4 lista	Jednogodišnji širokolisni korovi
			0,5 l/ha – 2 lista i nakon 10-15 dana	
			0,75 l/ha – 3 lista i nakon 10-15 dana	
			0,1 l/ha – prvi pravi list i 2 put 0,2 l/ha u razmaku 7-10 dana	
	Iz lučica nakon sadnje, prije nicanja	GALIGAN 240 EC	0,8 – 1,2 l/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
	Iz lučica i presadnica, nakon nicanja		1,5 l/ha ukupno u 2-3 puta, prvi put kad presadnice imaju 2 prava lista, nakon 10-15 dana	
	Nakon sjetve ili sadnje luka iz sjemena ili lučica, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
		LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha	
	Luk iz lučice – korovi i luk 3-6 lista (intenzivan porast korova)	TOMIGAN 250 EC *	0,4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
	Iz lučice- nakon sjetve, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA *	1,35 l/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
	FUNGICIDI			
	U vegetaciji, preventivno ili kod pojave prvih simptoma	BUMPER 25 EC **	0,5 l/ha	Plamenjača luka, hrda, obična pjegavost – Cladosporium allii - cepae
	INSEKTICIDI			
	Prije sjetve	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
	Kod pojave prvih znakova štete	PYRINEX 48 EC **	2 l/ha	Sovice pozemljuše (Agrotis spp.)
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU