

Zaštita mrkve



Zaštita mrkve

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Nakon sjetve, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA ILI (LINUREX 50 SC)	1,35 l/ha (1,1 – 1,2 l/ha) ili dvokratno 0,675 + 0,675 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja (do 5 dana nakon sjetve)	RACER 25 EC **	2 -3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	MISTRAL 70 WG *	1kg/ ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon nicanja, mrka 1-3 prava lista – samo površine korištene za sjemensku proizvodnju	TOMIGAN 250 EC **	0,8 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ** ILI LEOPARD 5 EC **	0,5-2 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Kod pojave simptoma, ponoviti u razmacima 7 dana	NIMROD 25 EC **	0,4 l/ha	pepelnica
INSEKTICIDI			
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	0,15 l/ha	lisne sovice
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škopivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU