

| <br><b>Zaštita<br/>ogrozda</b> | FENOFAZA<br>VRIJEME PRIMJENE                                              | PREPARAT         | KONC. ili DOZA     | NAPOMENA                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>HERBICIDI</b>                                                          |                  |                    |                                                                                   |
|                                                                                                                 | Od jeseni do početka otvaranja pupova (mirovanje vegetacije)              | PENDIGAN 330 EC  | 4 l/ha             | Jednogodišnji travni i neki širokolisni i korovi                                  |
|                                                                                                                 | U vrijeme intenzivnog porasta korova                                      | AGIL ** 100 EC   | 0,5 – 2 l/ha       | Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi               |
|                                                                                                                 | <b>FUNGICIDI</b>                                                          |                  |                    |                                                                                   |
|                                                                                                                 | Nakon prvih znakova bolesti, ponoviti u intervalima od 7 dana             | NIMROD 25 EC **  | 0,7 l/ha           | Američka i europska pepelnica                                                     |
|                                                                                                                 | <b>INSEKTICIDI</b>                                                        |                  |                    |                                                                                   |
|                                                                                                                 | Nakon pojave štetnika                                                     | LAMDEX 5 EC **   | 35 ml / 100 l vode | Osica ribiza, ribizova muha, šiškarica                                            |
|                                                                                                                 | Od pojave napada početak cvatnje i nakon 3 tjedna. Preventivno po potrebi | PYRINEX 48 EC ** | 1 – 1,5 l/ha       | Lisne uši, gusjenice, lisne stjenice, crveni pauk                                 |
|                                                                                                                 | <b>OSTALO</b>                                                             |                  |                    |                                                                                   |
|                                                                                                                 | Zimsko prskanje U vegetaciji                                              | NU-FILM-17 **    | 1 l/ha<br>0,4 l/ha | U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima |

\* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

\*\* primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU