




Zaštita pastirnjaka

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije nicanja	GOLTIX 70 WG *	3 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA ILI (LINUREX 50 SC)	1,35 l/ha (1,1 – 1,2 l/ha)	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon nicanja – usjev min. 2 prava lista, korovi do 2 lista		1,35 l/ha (1,1 – 1,2 l/ha) Ili dvokratno 0,675 + 0,675 l/ha	
Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC	4 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja (do 5 dana nakon sjetve)	RACER 25 EC **	2 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja	MISTRAL 70 WG *	1 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja Kod pojave korova, usjev u stadiju prvih pravih istova; Najkasnije 50 dana prije berbe	AFALON DISPERZIJA ** ili (LINUREX 50 SC **)	1,35 l/ha (1,2 l/ha)	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC **	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
INSEKTICIDI			
U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	0,15 l/ha	lisne sovce
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 - 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU