

 Zaštita peršina	FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
	HERBICIDI			
	Nakon sjetve, prije nicanja	AFALON DISPERZIJA ILI LINUREX 50 SC	1,35 l/ha (1,1 – 1,2 l/ha)	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
	Nakon nicanja – usjev min. 2 prava lista, korovi do 2 lista		1,35 l/ha (1,1 – 1,2 l/ha) ili dvokratno 0,675 + 0,675 l/ha	
	Nakon sjetve, prije nicanja	PENDIGAN 330 EC *	4,5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
	Nakon sjetve, prije nicanja (do 5 dana nakon sjetve)	RACER 25 EC **	2 – 3 l/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
	Nakon nicanja, peršin 20 cm – samo površine korištene za sjemensku proizvodnju	TOMIGAN 250 EC **	0,8 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
	Nakon nicanja	AGIL 100 EC **	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	FUNGICIDI			
	Kod pojave simptoma, ponoviti u razmacima 7 dana	NIMROD 25 EC **	0,4 l/ha	pepelnica
	INSEKTICIDI			
	U vegetaciji kod pojave štetnika	LAMDEX 5 EC **	0,15 l/ha 0,3 l/ha	lisne sovice Mrkvina muha
	OSTALO			
		NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU