



Zaštita rajčice

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije presađivanja	PENDIGAN 330 EC	4 – 5 l/ha	Jednogodišnji travni i neki širokolisni korovi
8-10 dana nakon presađivanja	MISTRAL 70 WG	0,5 – 0,75 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni i neki travni korovi
Nakon nicanja	AGIL 100 EC ILI	0,5 – 2 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
	LEOPARD 5 EC **	0,8 – 3 l/ha	
FUNGICIDI			
U vegetaciji, preventivno ili kod pojave prvih simptoma	NIMROD 25 EC **	0,04 – 0,05 %	pepelnica
INSEKTICIDI			
Prije sadnje	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom	Zemljišni štetnici – žičnjaci, sovci, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo
U vegetaciji kad se primjete simptomi ili štetnici ako presadnice nisu potapane	KOHINOR 200 SL	0,5 – 0,75 l/ha	Lisne uši, **, tripsi,**
		1 l/ha	štitači moljac
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene

** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU