




Zaštita šećerne repe

FENOFAZA VRIJEME PRIMJENE	PREPARAT	KONC. ili DOZA	NAPOMENA
HERBICIDI			
Prije sjetve	GLYPHOGAN	1,5 – 4 l/ha	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i travni korovi
Nakon sjetve, prije nicanja repe i korova	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX SC 700	2 – 3 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe – 1. post – korovi u fazi kotiledona	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX SC 700	1,5 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe – 2. post – nakon 7-10 dana, repa prvi par listova	GOLTIX WG 70 ili GOLTIX SC 700	1,5 kg/ha	Jednogodišnji širokolisni korovi
Nakon nicanja repe – 2. post	AGIL 100 EC ili LEOPARD 5 EC	0,5 – 2 l/ha 0,8 – 3 l/ha	Jednogodišnji (3-5 listova) i višegodišnji (20-30 cm) travni korovi
FUNGICIDI			
Kod pojave prvih znakova bolesti	BUMPER 25 EC **	0,5 l/ha	Ramularia
INSEKTICIDI			
Prije sjetve ili sa sjetvom u vrijeme pojave	PYRINEX 48 EC	6 – 8 l/ha širom 3 l/ha u trake širine 10-15 cm 1,5 l/ha	Zemljišni štetnici - žičnjaci, sovice, rovci, hrušt uz obavezno unošenje u tlo Repina pipa**, lisne sovice**, lisne uši**, repin moljac**
u vrijeme pojave	LAMDEX 5 SC **	0,1 – 0,15 l/ha	Lisne sovice, sovice pozemljuše, repin buhač, repina muha
u vrijeme pojave – prije pojave simptoma kovrčanja lista	MAVRIK 2 F	0,2 l/ha	Lisne uši (crna repina uš)
OSTALO			
	NU-FILM-17 **	0,025 – 0,075 %	U EU registriran kao pomoćno sredstvo (ovlaživač/ljepilo) dodatak svim škropivima

* Dozvola za proširenje uporabe na male kulture i male namjene
 ** primjena sredstva u ovoj kulturi nije registrirana u Hrvatskoj, ali je registrirana u nekim zemljama EU