



## Confidor SL 200

Confidor® SL 200 nije samo sredstvo za suzbijanje štetočina, nego i u biljkama povećava otpornost na sve nežive (abiotske) faktore stresa kao što su suša, visoke temperature, ozon, svjetlo i ostali. Učinak sredstva Confidor® SL 200 na fiziološke procese u biljci pokazuje se u obliku poboljšanja fotosintetskih procesa i učinkovitijeg iskorištavanja energije u stresnim uvjetima. Biljke, tretirane Confidor®-om su snažnije, otpornije i kvalitetnije.



**Sastav** imidaklopid (200 g/L)

**Formulacija** tekući koncentrat za otopinu (SL)

### Uporaba:

Sistemični, insekticid Confidor SL 200 koristi se za suzbijanje štetnika:

#### a) u nasadima koštičavih i jezgričavih voćaka:

- minera okruglih mina (*Cermiostoma scitella*) u koncentraciji 0,0375 %-0,05 % (37,5-50 ml u 100 l vode),
- jabučne pepeljaste uši (*Dysaphis plantaginea*), jabučne zelene uši (*Aphis pomi*), breskvine zelene uši (*Myzus persicae*) u koncentraciji 0,025 % (25 ml u 100 l vode),
- jabučne krvave uši (*Eriosoma lanigerum*) u koncentraciji 0,05 % (50 ml u 100 l vode).

Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

#### b) na agrumima:

- lisne uši agruma (*Aphididae*) u koncentraciji 0,15 % (150 ml u 100 l vode),
- odraslog stadija štitastog moljca agruma (*Dialeurodes citri*) u koncentraciji 0,10-0,15 % (100-150 ml u 100 l vode),
- lisnog minera agruma (*Phyllocnistis citrella*) u koncentraciji 0,10-0,20 % (100-200 ml u 100 l vode).

Godišnje se ne smije koristiti više od 2,35 l/ha sredstva CONFIDOR SL 200.

Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

#### c) na ruži (na otvorenom prostoru):

- lisna uš (*Macrosiphum rosae*) u koncentraciji 0,05-0,15 % (50-150 ml u 100 l vode).

CONFIDOR SL 200 može se koristiti na ružama samo jednom godišnje.

Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje.

#### d) na ukrasnom bilju (zaštićeni prostor):

- lisne uši ljiljana (*Aphididae*) u koncentraciji 0,10 % (100 ml u 100 l vode),
- duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*) u koncentraciji 0,10 % (10 ml u 100 l vode)
- zvjezdasti crvac (*Pseudococcus longispinus*) na gardeniji u koncentraciji 0,05-0,10 % (50-100 ml u 100 l vode),
- odraslog stadija štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*) na gerberima u koncentraciji 0,15-0,20 % (150-200 ml u 100 l vode) i na buvardiji u koncentraciji 0,10 % (100 ml u 100 l vode),

CONFIDOR SL 200 može se koristiti na ukrasnom bilju samo jednom godišnje.

#### e) na rajčici (zaštićeni prostor):

- odraslog stadija štitastog moljca (*Trialeurodes vaporariorum*) u koncentraciji 0,10 % (100 ml u 100 l vode),
- duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*) u koncentraciji 0,075 %.

#### f) na grahu i grašku (u polju):

- graškove zelene uši (*Acyrtosiphon pisum*) na grašku i crne bobove uši (*Aphis fabae*) na grahu u količini 0,25-0,5 l/ha (2,5-5 ml na 100 m<sup>2</sup>).

Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje.

#### g) na duhanu:

- zelene breskvine uši (*Myzus persicae*) u količini 0,25 - 0,5 l/ha (2,5 - 5 ml na 100 m<sup>2</sup>)

#### h) na krumpiru:

- krumpirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) u količini od 250-500ml/ha (2,5 - 5 ml na 100 m<sup>2</sup>),

Sredstvo se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji.

#### i) na kupusu:

- kupusne lisne uši (*Brevicoryne brassicae*) i lisnih sovica (*Mamestra spp.*) tretiranjem presadnica kupusa namakanjem u otopini insekticida u koncentraciji 0,10 % (100 ml / 100 l vode) u vremenu od 15 minuta. Sredstvo iskazuje učinak do 60 dana.

#### j) na krastavcima:

- duhanovog štitastog moljca (*Bemisia tabaci*) u koncentraciji 0,075 % (75 ml sredstva u 100 l vode ili 7,5 ml sredstva u 10 l vode). Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

#### Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

##### a) palme:

- crvena palmina pipa (*Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)*) primjena kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada. Samo za profesionalnu upotrebu. Primjenjuje se injektiranjem u deblo u količini 4-10 ml/svaki 1,5-2 metra promjera krune palme. Vremenski razmak između primjena iznosi 45-55 od ožujka do studenog. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 6. Dodatne informacije: Zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje u količini 8-10 l/ha. Vremenski razmak između primjena iznosi 30-40 dana. Primjenjuje se kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada. Maksimalni broj primjena je 2. Prskanjem vegetacijskog vrha biljke u koncentraciji 0,05-0,075%. Kod pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada.

##### b) ukrasno bilje:

- tripsi (*Thrips spp.*) ne tretirati u vrijeme cvatnje. Tretirati nakon leta pčela. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada tripsa. Primjenjuje se u količini od 5-12,5 ml/10l vode. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Vrijeme primjene: Kod prve pojave štetnika ili pojave prvih simptoma napada.  
Samo za profesionalnu upotrebu.

#### Priprema sredstva za uporabu

Propisana i odmjerena količina preparata ulije se direktno u spremnik (rezervoar) prskalice u kojem je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode za određenu površinu. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje. Prska se traktorskim ili leđnim prskalicama.

#### Ograničenje

Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje. Na površinama ili nasadima u kojima je primijenjeno sredstvo, u istoj godini se ne smije uzgajati lisnato povrće, bilo kao usjev, bilo kao idući usjev. Nakon tretiranja presadnica kupusa u vegetaciji nije dozvoljena folijarna primjena Confidor® SL 200.  
Tretirati nakon leta pčela!

#### Fitotoksičnost

Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, Confidor® SL 200 nije fitotoksičan za navedene kulture.

#### Zaštita okoliša

Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m i 50 m kod primjene u voćnjacima. Ostaci škropiva ne smiju se ispuštati u odvodne kanale.

#### Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

#### Miješanje

Može se miješati s uobičajenim insekticidima.

#### Karenca

14 dana za rajčicu, krastavac, grah i grašak, a 21 dan za kupus, jezgričavo i koštičavo voće i duhan i 35 dana za agrume, 42 dana za krumpir.

#### Skladištenje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 0 °C ni viša od 40 °C.

## Datoteke za download

 **Varnostni list 2014** [362 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.