



Decis 2,5 EC

Decis® 2,5 EC je isproban i cjenovno privlačan insekticid. Odlično suzbija štetočine na voćkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.

Sastav deltametrin (25 g/L)

Formulacija tekući koncentrat za emulziju (EC)

Uporaba

Decis 2,5 EC upotrebljava se za suzbijanje:



1) voćarstvo:

- jabučna zelena uš (*Aphis pomi*) i jabučna pepeljasta uš (*Dysaphis plantaginea*) u koncentraciji 0,03 % i 0,05 % i to prije kovrčanja listova;
- miner okruglih mina (*Ceratomyza scitella*) u koncentraciji 0,03 % i 0,05 %;
- jabučna osa pilatka (*Hoplocampa testudinea*) u koncentraciji 0,03 % i 0,05 %;
- jabučni savijač (*Carpocapsa pomonella*) u koncentraciji 0,02 % i 0,03 %.

2) vinogradarstvo: pepeljasti grožđani moljac (*Lobesia botrana*) i žuti grožđani moljac (*Eupoecilia ambiguella*) u koncentraciji 0,03 % i 0,04 %. Vinova loza (vinske sorte) i vinova loza (stolne sorte): američki cvrčak (*Scaphoideus titanus*) u količini 0,5 l/ha (5 ml na 100 m²) uz uporabu 1000 l vode po ha. Preporuča se tretiranje nakon cvatnje vinove loze do fenološke faze kada bobice dosegnu veličinu graška (BBCH 71 do 75). Kasnija primjena nije dozvoljena zbog rizika za ne ciljane organizme. Na istoj površini dozvoljena je samo jedno tretiranje u sezoni. U rasadnicima vinove loze i matičnim vinogradima dozvoljene su dvije aplikacije u jednoj sezoni rasta. Termine tretiranja potrebno je prilagoditi tehnološkim uputama za suzbijanje američkog cvrčka;

3) krumpir: krumpirova zlatica (*Leptinotarsa decemlineata*) u dozi od 0,3 l/ha samo na površinama u onim područjima Hrvatske gdje nije još prisutna otpornost zlatice na sintetske piretroide.

4) uljana repica: repičin sjajnik (*Meligethes aeneus*) u dozi od 0,3 l/ha;

5) strne žitarice: lisnih uši (*Aphididae*) i crvenog žitnog balca (*Oulema melanopus*) u količini 0,2-0,3 l/ha (2 do 3 ml na 10 l vode na 100 m²) uz uporabu 300 - 400 l vode na ha.

6) jabuka: savijač kože ploda (*Capua reticulana*), savijač kože ploda (*Pandemis cerasana*), savijač kože ploda (*Pandemis heparana*), savijač kože ploda (*Archips podana*), ružinog savijača (*Archips rosana*), jabučni cvjetar (*Anthonomus pomorum*), mušica šiškarica lišća jabuke (*Dasyneura mali*), mediteranska voćna muha (*Ceratitis capitata*) u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Primijeniti sredstvo kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje;

7) kruška: zelena jabučna uš (*Aphis pomi*), jabučni savijač (*Cydia pomonella*), savijač kože ploda (*Capua reticulana*), savijač kože ploda (*Pandemis cerasana*), savijač kože ploda (*Pandemis heparana*), savijač kože ploda (*Archips podana*), ružin savijač (*Archips rosana*), kruškina osica (*Hoplocampa brevis*), mušica šiškarica lista kruške (*Dasyneura pyri*), mediteranska voćna muha (*Ceratitis capitata*), obična kruškina buha (*Psylla pyri*) u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Za suzbijanje lisnih uši sredstvo primijeniti prije cvatnje. Za suzbijanje obične kruškine buhe primijeniti kod opadanja listova. Za ostale navedene štetnike primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje;

8) breskva i marelica: breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), lisna uš *Hyalopterus amygdali* (*Hyalopterus amygdali*), breskvini savijač (*Cydia molesta*), breskvini moljac (*Anarsia lineatella*), trips Thrips major (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*) i duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Za suzbijanje lisnih uši i tripsa sredstvo primijeniti kod pojave štetnika, u fazi pred cvatnju (ružičasti pupovi). Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana. Kod primjene u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje;

9) šljiva: breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), lisna uš *Hyalopterus amygdali* (*Hyalopterus amygdali*), crna osa šljivarica (*Hoplocampa minuta*), žuta osa šljivarica (*Hoplocampa flava*), mediteranska voćna muha (*Ceratitis capitata*) u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Sredstvo primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana. Kod tretiranja u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje;

10) trešnja: breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), lisna uš *Hyalopterus amygdali* (*Hyalopterus amygdali*), trešnjična muha (*Rhagoletis cerasi*) u količini 0,3-0,7 l/ha (30-50 ml/hl). Sredstvo primijeniti kod pojave štetnika. Može se tretirati najviše 3 puta u razmacima od 14 dana. Kod tretiranja u fazi pred cvatnju, sljedeća tretiranja provesti isključivo nakon završetka cvatnje;

11) agrumi: crna uš agruma (*Toxoptera aurantii*), pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), mediteranska voćna muha (*Ceratitis capitata*) u količini 0,4-0,5 l/ha (35-40 ml/hl). Može se tretirati najviše jedan puta kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada;

12) kivi: mediteranska voćna muha (*Ceratitis capitata*), medeći cvrčak (*Metcalfa pruinosus*), dudova štitasta uš (*Diaspis pentagona*), maslinov medić (*Saissetia oleae*) u količini 0,4-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

13) masline: maslinov moljac (*Prays oleae*), maslinina muha (*Bactrocera oleae*) u količini 0,4-0,7 l/ha (40-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

14) jagode (na otvorenom prostoru): lisna uš *Sitobion fragariae* (*Sitobion fragariae*), pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), jagodina lisna uš (*Chaetosiphon fragaefolii*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

15) jagode (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje: lisnih uši vrste *Sitobion fragariae*, pamukove lisne uši (*Aphis gossypii*), jagodine lisne uši (*Chaetosiphon fragaefolii*), duhanovog tripsa (*Thrips tabaci*) u koncentraciji 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana.

16) kukuruz, kukuruz šećerac, sirak: zobena lisna uš (*Macrosiphum avenae*), kukuruzna lisna uš (*Rhopalosiphum maidis*), kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), usjevna sovica (*Agrotis segetum*), sovica ipsilon (*Agrotis ipsilon*), u količini 0,3-0,5 l/ha. Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

17) šećerna repa i krmna repa: crna repina (bobova) uš (*Aphis fabae*), repin buhač (*Chaetocnema tibialis*), kupusna sovica (*Mamestra brassicae*), usjevna sovica (*Agrotis segetum*), sovica ipsilon (*Agrotis ipsilon*), pipa *Conorhynchus mendicus* (*Conorhynchus mendicus*), blitvina pipa (*Lixus junci*), atomarija (*Atomaria linearis*), repina muha (*Pegomyia betae*), štitasti kornjaš *Cassida vittata* (*Cassida vittata*) u količini 0,3-0,5 l/ha. Može se primijeniti najviše jedan puta kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada;

18) lucerna, djetelina i krmno bilje: crna uš leguminoza (*Aphis craccivora*), roščica (cvjetožder) *Apion pisi* (*Apion pisi*), lucemina lisna pipa (*Hypera variabilis*), talijanski skakavac (*Calliptamus italicus*), marokanski skakavac (*Dociostaurus maroccanus*) u količini 0,25 l/ha kod pojave štetnika. Prema potrebi ponoviti tretiranje;

19) uljana repica: repičin sjajnik (*Meligethes aeneus*), kupusni buhač *Phyllotreta atra* (*Phyllotreta atra*), kupusni buhač *Phyllotreta nigripes* (*Phyllotreta nigripes*), kupusni buhač *Phyllotreta undulata* (*Phyllotreta undulata*), repičin crvenoglavi buhač (*Psylliodes chrysocephala*), kupusni bijelac (*Pieris brassicae*), mali kupusar (*Pieris rapae*), velika repičina pipa (*Ceutorhynchus napi*) u količini 0,3 l/ha kod pojave štetnika u ranoj fazi napada. Može se primijeniti najviše 4 puta i to u razmacima od 14 dana;

20) krumpir: breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), mlječikina lisna uš (*Macrosiphum euphorbiae*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) te za smanjenje zaraze krumpirovog moljca (*Phthorimaea operculella*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Tretirati kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmacima od 14 dana;

21) rajčica, paprika, patlidžan (na otvorenom): breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), žuta kukuruzna sovica (*Heliothis armigera*), duhanov trips (*Thrips tabaci*), kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), gama sovica (*Plusia gamma*), stjenica *Nezara viridula* (*Nezara viridula*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

22) rajčica, paprika, patlidžan (u zaštićenom prostoru): breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), žuta kukuruzna sovica (*Heliothis armigera*), duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*), staklenički štitasti moljac (*Trialetrodes vaporariorum*), duhanov trips (*Thrips tabaci*), kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), gama sovica (*Plusia gamma*), zelena stjenica (*Nezara viridula*) u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 4 puta u razmacima od 7 dana;

23) krastavac, krastavac za preradu (kornišon), tikvice (na otvorenom): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

24) krastavac, krastavac za preradu (kornišon), tikvice, (u zaštićenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*), staklenički štitasti moljac (*Trialetrodes vaporariorum*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,5-0,7 l/ha (45-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

25) dinja, lubenica, tikva (na otvorenom): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

26) dinja, lubenica, tikva (u zaštićenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), breskvina zelena uš (*Myzus persicae*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,5-0,7 l/ha (60-70 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

27) grah, mahune, bob, grašak: crna repina (bobova) uš (*Aphis fabae*), graškova zelena uš (*Acyrtosiphon pisum*), kukuruzni moljac (*Ostrinia nubilalis*), prugasta pipa mahunarka (*Sitona lineatus*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod prve pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana;

28) artičoke: šljivina velika uš (*Brachycaudus cardui*), šljivina uš uvijalica (*Anuraphis helichrysi*), sovica artičoke (*Hydroecia xanthenes*), moljac *Choreutis bjerckandrella* (*Choreutis bjerckandrella*), sovica *Agrochola lychnidis* (*Agrochola lychnidis*), *Spodoptera littoralis* (*Spodoptera littoralis*), karadrina (*Spodoptera exigua*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

29) zelena salata (na otvorenom prostoru): salatina lisna uš (*Nasonovia ribis-nigri*), *Spodoptera littoralis* (*Spodoptera littoralis*), karadrina (*Spodoptera exigua*), kupusna sovica (*Mamestra brassicae*), repičina osa listarica (*Athalia rosae*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50-60 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

30) zelena salata (u zaštićenom prostoru): salatina lisna uš (*Nasonovia ribis-nigri*), *Spodoptera littoralis* (*Spodoptera littoralis*), karadrina (*Spodoptera exigua*), kupusna sovica (*Mamestra brassicae*), repičina osa listarica (*Athalia rosae*) u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

31) kupusnjače (za cvat, glavate i lisnate): kupusni štitasti moljac (*Aleyrodes proletella*), kupusna lisna uš (*Brevicoryne brassicae*), kupusna sovica (*Mamestra brassicae*), mali kupusar (*Pieris rapae*), kupusni bjelac (*Pieris brassicae*), kupusni buhač *Phyllotreta atra* (*Phyllotreta atra*), kupusni buhač *Phyllotreta nigripes* (*Phyllotreta nigripes*), kupusni moljac (*Plutella xylostella*), kupusni moljac (*Plutella maculipennis*), trips *Thrips major* (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 7 dana;

31) luk, poriluk, češnjak, luk kozjak, vlasac: duhanov trips (*Thrips tabaci*), lukova zlatica (*Lilioceris merdiger*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50

ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

32) šparoge: šparogina zlatica (*Crioceris asparagi*), duhanov trips (*Thrips tabaci*), lisna uš *Brachycorynella asparagi* (*Brachycorynella asparagi*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Sredstvo se smije primijeniti kod mladih šparoga koje nisu u rodu, a kod šparoga u rodu smije se primijeniti nakon berbe tj. Od sredine lipnja do sredine rujna. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana. Ne tretirati jestive izdanke šparoga.

33) špinat: crna bobova uš (*Aphis fabae*), repin štitasti komjaš (*Cassida nobilis*) u količini 0,35 l/ha (35-55 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 2 puta u razmaku od 14 dana;

34) mrkva, rotkvica: mrkvina lisna uš (Caviariella aegopodii), lisna uš *Dysaphis foeniculus* (*Dysaphis foeniculus*), lisna uš *Dysaphis apiifolia* (*Dysaphis apiifolia*), lisna uš *Dysaphis crataegi* (*Dysaphis crataegi*), muha lisni miner *Phytomyza atricornis* (*Phytomyza atricornis*), graškov lisni miner (*Liriomyza huidobrensis*), kupusni buhač *Phyllotreta atra* (*Phyllotreta atra*), kupusni buhač *Phyllotreta nigripes* (*Phyllotreta nigripes*), kupusni buhač *Phyllotreta undulata* (*Phyllotreta undulata*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 14 dana;

35) cvijeće (na otvorenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), ružina lisna uš (*Macrosiphum rosae*), ahatna soвица (*Phlogophora meticulosa*), kupusna soвица (*Mamestra brassicae*), medeči cvrčak (*Metcalfa pruinosa*), ružina osica (*Arge pagana*), osa listarica *Ardis sulcata* (*Ardis sulcata*), trips *Thrips major* (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

36) cvijeće (u zaštićenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), ružina lisna uš (*Macrosiphum rosae*), ahatna soвица (*Phlogophora meticulosa*), kupusna sovic (*Mamestra brassicae*), medeči cvrčak (*Metcalfa pruinosa*), duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*), cvjetni štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*), trips *Thrips major* (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (30 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

37) u rasadnicima ukrasnog bilja i na ukrasnom bilju (na otvorenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), ružina lisna uš (*Macrosiphum rosae*), ahatna soвица (*Phlogophora meticulosa*), kupusna soвица (*Mamestra brassicae*), medeči cvrčak (*Metcalfa pruinosa*), ružina osica (*Arge pagana*), osa listarica *Ardis sulcata* (*Ardis sulcata*), trips *Thrips major* (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

38) u rasadnicima ukrasnog bilja i na ukrasnom bilju (u zaštićenom prostoru): pamukova lisna uš (*Aphis gossypii*), ružina lisna uš (*Macrosiphum rosae*), ahatna soвица (*Phlogophora meticulosa*), kupusna soвица (*Mamestra brassicae*), duhanov štitasti moljac (*Bemisia tabaci*), cvjetni štitasti moljac (*Trialeurodes vaporariorum*), trips *Thrips major* (*Thrips major*), breskvini trips (*Thrips meridionalis*), duhanov trips (*Thrips tabaci*) u količini 0,3-0,5 l/ha (35-50 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Može se primijeniti najviše 3 puta u razmacima od 7 dana;

39) topola i šumsko raslinje u rasadnicima (mladi nasadi): mali topolin staklokrilac (*Paranthrene tabaniformis*), staklokrilac *Synanthedon vespiformis* (*Synanthedon vespiformis*), velika topolova strizibuba (*Saperda carcharias*), mala topolova strizibuba (*Saperda populnea*), crvena topolova zlatica (*Melasoma populi*) u količini 0,3-0,5 l/ha (50-75 ml/hl). Može se primijeniti samo jednom kod pojave štetnika, u ranoj fazi napada. Na stablima primjena je u količini 0,4 l/ha (80 ml/hl);

40) na golf terenima i ukrasnim travnjacima: cma uš leguminoza (*Aphis craccivora*), roščica (cvjetožder) *Apion pisi* (*Apion pisi*) i lucemina lisna pipa (*Hypera variabilis*) u količini 0,3-0,5 l/ha (75-80 ml/hl). Primijeniti kod pojave štetnika. Ponoviti primjenu prema potrebi;

41) duhan: breskvina lisna uš (*Mysus persicae*) i sovice pozemljuše (*Agrotis spp.*) u količini 0,3 – 0,5 l/ha (3 – 5 ml na 10 l vode na 100 m2) uz uporabu 400 l vode po ha

42) ukrasno bilje (u zaštićenom prostoru): muha lisni miner (*Liriomyza trifolii*) i tripsi (*Thrips spp.*) sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štetnika. Ne tretirati u vrijeme cvatnje biljaka ili prisutnih korova. Prije primjene sredstva poželjno je na manjoj površini napraviti test. Primijeniti sredstvo kasno popodne ili na večer. Sredstvo se primjenjuje toplim zamagljivanjem, raspršivanjem sredstva u potpuno zatvorenom prostoru. Ne ulaziti bez zaštite u tretirani prostor 12 h nakon tretiranja. Tretirani prostor treba zaključati preko noći sa jasno napisanim upozorenjem zabrane ulaska. Prije ulaska u takav prostor potrebno je prethodno dobro prozračiti prostor.

Priprema sredstva za uporabu

Prije otvaranja ambalaže preparat dobro promućkati. Odmjerenu količinu sredstva razrijediti sa malo vode u posebnoj posudi, a zatim uliti u određenu količinu vode uz stalno miješanje.

Ograničenje

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini ili nasadu.

Fitotoksičnost

Ako se sredstvo upotrebljava u preporučenim koncentracijama i količinama, na pravilan način i u optimalno vrijeme, ono nije fitotoksično na navedene kulture. To se odnosi na poznate sorte istih, a nove sorte i hibride je potrebno ispitati na fitotoksičnost.

Zaštita okoliša

Sredstvo se ne smije primjenjivati u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Miješanje

Ne preporuča se miješati Decis® 2,5 EC s lužnatim formulacijama! Ne smije se miješati s herbicidima na bazi metribuzina.

Karenca

45 dana za uljanu repicu; 35 dana za žitarice; 30 dana za agrume, kukuruz, sirak, šećernu repu, krmnu repu; 21 dan za vinovu lozu; 14 dana za kivi, lucemu, djetelinu, krmno bilje; 7 dana za jabuku, krušku, šljivu, trešnju, masline, krumpir, grah, mahune, bob, grašak, zelena salata u zaštićenom prostoru, kupusnjače (za cvat, glavate i lisnate), luk, poriluk, češnjak, luk kozjak, vlasac, mrkva, rotkvica; 3 dana za breskvu, marelicu, jagode, kukuruz šećerac, rajčicu, papriku, patlidžan, krastavac, krastavac za preradu (komišon), tikvice, dinje, lubenice, tikve, artičoke, zelenu salatu na otvorenom, špinat. Osigurana vremenom primjene za šparogu. Nije primjenjiva za cvijeće, rasadnike ukrasnog bilja, ukrasno bilje, topolu, šumsko raslinje u rasadnicima, golf terene, ukrasne travnjake, duhan

Skладиštenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Iskustva s terena

Decis® 2,5 EC se ne smije upotrebljavati na previsokim temperaturama (iznad 28 °C), jer je jako hlapljiv. To važi za sve piretroide.

Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [409 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.