



Antracol WG 70

ANTRACOL WG 70 je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Sastav: Propineb (70%)

Formulacija: WG Vododispergirajuće granule

Uporaba:



ANTRACOL WG 70 se primjenjuje u sljedećim kulturama:

a) vinskim i stolnim sortama vinove loze za suzbijanje:

- plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha;
- crne pjegavosti rozgve (*Phomopsis viticola*) u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.

b) jabukama i kruškama za suzbijanje krastavosti (*Venturia* spp.) u koncentraciji 0,2% (20 g na 10 l vode), odnosno u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje prije cvatnje. Na istoj površini, sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta u vrijeme vegetacije.

c) rajčici na otvorenom i u zaštićenim prostorima za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) i koncentrične pjegavosti (*Alternaria solani*) u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

d) krastavcima, lubenicama i dinjama za suzbijanje plamenjače (*Pseudoperonospora cubensis*) i antraknoze (*Colletotrichum lagenarium*) u koncentraciji 0,3% (30 g na 10 l vode), odnosno u količini 3 kg/ha uz utrošak vode 1000 l/ha.

Sredstvo se primjenjuje u bilo kojoj razvojnoj fazi biljke. Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše četiri puta u vrijeme vegetacije.

e) krumpiru za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) i koncentrične pjegavosti (*Alternaria solani*) u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m²), uz utrošak vode 400 - 600 l/ha.

Na istoj površini, sredstvo se može primijeniti najviše tri puta u vrijeme vegetacije. Prvi puta se tretira kada usjev zatvori redove.

Vrsta i način primjene: Primjenjuje se folijamo rasprskivačem ili prskalicom.

Ograničenja:

Sredstvo se ne smije upotrebljavati za vrućeg i suhog vremena.

Primjena sredstva ANTRACOL WG 70 iz zrakoplova nije dopuštena.

Sredstvo ANTRACOL 70 WG štetno je za neciljane člankonošce.

Priprema sredstva za primjenu:

Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.

1. Odmjerenu količinu sredstva pomiješati s malo vode u posebnoj posudi dok se ne dobije fina jednolična suspenzija.

2. Spremnik prskalice ili rasprskivača napuniti s 2/3 potrebne količine čiste vode.
3. Uključiti miješalicu.
4. Uliti suspenziju sredstva u spremnik prskalice ili rasprskivača. Ostatke suspenzije iz posebne posude isprati u spremnik prskalice ili rasprskivača.
5. Preostalu potrebnu količinu vode dodati u spremnik prskalice ili rasprskivača.
6. Škropivo treba utrošiti odmah nakon pripreme uz rad miješalice.
7. Nakon radnih stanki škropivo se ponovno mora pažljivo promiješati.

Karenca: 7 dana za krastavce, dinje, lubenice; 14 dana za rajčicu na otvorenom, krumpir; 28 dana za rajčicu u zaštićenim prostorima, jabuke i kruške; 56 dana za vinske i stolne sorte vinove loze.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva ANTRACOL WG 70 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ANTRACOL WG 70 **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i ne ciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi **najmanje 10 metara**. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u navedenim koncentracijama i količinama te na pravilan način, ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena.

Mogućnost miješanja: ANTRACOL WG 70 ne smije se miješati sa sredstvima kisele reakcije. Mješavine s lužnatim sredstvima (npr. bakreno-vapnena juha) potrebno je odmah uporabiti.

O mogućnostima miješanja sredstva ANTRACOL WG 70 s drugim sredstvima za zaštitu bilja raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, na suhom, tamnom i prozračnom mjestu u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića, drugih proizvoda i hrane za životinje te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Ne smije se presipavati u drugu ambalažu ni u posude iz kojih se jede i pije, ili u kojima se drži hrana. Temperatura uskladištenja je od 0°C do 40°C.

Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Datoteke za download



[Sigurnosno-tehnički list](#) [371 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.