



Ethrel

Ethrel je sistemski fiziotrop kratke perzistentnosti, koji se koristi u nasadima višanja i rajčica, s ciljem postizanja ujednačenog dozrijevanja i lakše berbe.

Sastav etefon (480 g/L)

Formulacija tekući koncentrat za otopinu (SL)

Uporaba

Ethrel 480 SL je sistemski fiziotrop kratke perzistentnosti u:

- nasadima višanja, u količini od 0,5-0,7 L/ha u 1000 L vode/ha (tj. 50-70 mL u 100 L vode na 1000 m²). Tretirati treba u početku dozrijevanja plodova višnje u cilju ujednačenog dozrijevanja plodova i lakše berbe. Niža preporučena doza koristi se pri suhom i toplom vremenu, a viša pri hladnijem vremenu.
- rajčica, u količini od 2 L/ha u 1000 L vode/ha (tj. 20 mL u 10 L vode na 100 m²). Tretiranje treba obaviti u početku dozrijevanja rajčica u cilju ujednačenog dozrijevanja.

Priprema sredstva za uporabu

Kao tekući koncentrat za otopinu.

Ograničenje

Ethrel 480 SL smije se primijeniti samo jednom u vegetaciji. Ne smije se tretirati pred kišu. Alkalnu vodu ne koristiti za pripremu otopine jer se u njoj brzo razgrađuje. Vodi treba podesiti pH na 6. Iako nije perzistentan u tlu, nakon berbe na tretiranu površinu ništa se ne smije saditi/sijati 30 dana na tlima čiji je pH ispod 6,0 u polju.

Fitotoksičnost

Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju susjednih usjeva. Kod rajčice tretiranje pri temperaturi iznad 30 °C može izazvati fitotoksičnost. Umjereno stimulira defolijaciju masline.

Zaštita okoliša

Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Pri primjeni treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i mora radeći na najmanje 20 m od njih. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

Miješanje

Ne miješati s drugim sredstvima. Zabilježeni su slučajevi jake fitotoksičnosti u kombinaciji s bakrenim kao i ditiokarbamatnim fungicidima.

Karenca

7 dana za višnju i rajčicu.

Skladištenje

Preparat uskladištiti u originalno zatvorenom pakiranju u posebnoj prostoriji, na temperaturi od 0 °C do 30 °C, odvojeno od ljudske i stočne hrane i drugih proizvoda, na prohladnom i suhom mjestu, udaljeno od zapaljivih tvari, pod ključem, te izvan dohvata djece.

Datoteke za download



Sigumosno-tehnički list [403 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.