



Folicur EW 250

Folicur® EW 250 odlično suzbija pepelnicu vinove loze te bolesti na žitu, uljanoj repici i suncokretu. Vrhunski učinak Folicur®-a EW 250 dokazuju službeni pokusi i jednostavna primjena u praksi. Njegove su prednosti i jednostavna uporaba i dobra održivost u skladištima. Osim direktnog djelovanja na biljne patogene, Folicur® EW 250 djeluje i kao regulator rasta. Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimljuje što je jedan od preduvjeta visokog prinosa.



Sastav tebukonazol (250 g/L)

Formulacija koncentrat za emulziju (EW)

Uporaba

Folicur® EW 250 koristi se za suzbijanje biljnih bolesti na:

- a) pšenici:** pepelnica (*Blumeria /Erysiphe/ graminis*), smeđa pjegavost lišća i pljevica (*Septoria* spp.) u količini 0,75 - 1 l/ha (7,5 - 10 ml/100 m²), hrđe (*Puccinia* spp.) u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Smanjuje zarazu sa *Fusarium* spp.;
- b) ječmu:** mrežavost lista ječma (*Pyrenophora teres*), pepelnica (*Blumeria graminis*), siva pjegavost ječma (*Rhynchosporium secalis*) u količini 1 - 1,5 l/ha (10 - 15 ml/100 m²) i hrđe (*Puccinia* spp.) u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²);
- c) raži i zobi:** hrđe (*Puccinia* spp.), pepelnica (*Blumeria/Erysiphe/ graminis*), siva pjegavost (*Rhynchosporium secalis*) i pjegavost lišća zobi (*Septoria avenae*) u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²);
- d) suncokretu:** bijela trulež (*Sclerotinia sclerotiorum*), siva plijesan (*Botrytis cinerea*) u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m²), hrđa suncokreta (*Puccinia helianthi*) u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.
- e) vinovoj lozi:** pepelnica vinove loze (*Uncinula necator*), u koncentraciji od 0,03 % (30 ml na 100 l vode).
- f) uljanoj repici:** rak (*Sclerotinia sclerotiorum*), pjegavost (*Alternaria* spp.), siva plijesan (*Botrytis cinerea*) u dozi 1,5-2 l/ha.
- g) češnjaku:**
 - za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis* spp.), bijele truleži (*Sclerotium cepivorum*), hrđe (*Puccinia allii*) i čađavice (*Cladosporium* spp.) u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem;
 - za suzbijanje hrđa (*Puccinia allii*) i gljiva iz roda *Stemphylium* u količini 1 l/ha. Primijeniti folijarno raspršivanjem. Može se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.
- h) luku,** za suzbijanje sive plijesni (*Botrytis* spp.), bijele truleži (*Sclerotium cepivorum*), hrđe (*Puccinia allii*) i čađavice (*Cladosporium* spp.) u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Proširenja uporabe na male kulture i/ili male namjene:

a) na malini, kupini i rubus hibridima: sušenje mladica (*Leptosphaeria coniothyrium*) primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Priprema sredstva za uporabu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

Ograničenja

Folicur® EW 250 se može upotrijebiti najviše 2 puta godišnje na suncokretu i žitaricama, a na vinovoj lozi 3 puta godišnje. Na uljanoj repici se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji s tim da je prvo tretiranje u fazi 6 listova tj. u jesen.

Fitotoksičnost

Primijenjen u propisanim količinama i na opisani način Folicur® EW 250 nije fitotoksičan za spomenute kulture.

Zaštita okoliša

Kod primjene sa tla treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvora tako da se prskanje provodi na udaljenosti od najmanje 20 m od njih. Treba poštivati vodozaštitne zone.

Miješanje

Sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim fungicidima i insekticidima.

Karenca

42 dana za pšenicu, ječam, raž i zob te vinovu lozu i 56 dana za suncokret i uljanu repicu. Za malinu, kupinu i rubus hibride iznosi 14 dana. 21 dan za češnjak, osigurana vremenom primjene u luku.

Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

Iskustva s terena

Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimi. Primjenjujemo ga kada uljana repica ima 5 – 7 listova. Doza Folicura iznosi 0,1 L na 1 list uljane repice na ha (npr. 7 listova – 0,7 L Folicura na ha). U proljeće primijenimo 0,8 L Folicura na ha, kada uljana

repica ozeleni. Time suzbijamo gljivične bolesti iz roda *Alternaria*, bijelu trulež, sivu plijesan i druge.

U žitu ga preporučujemo za prskanje u klas, jer odlično suzbija i fuzarioze. Možemo ga miješati insekticidima (npr. Decis 2,5 EC).

U vinovoj ga lozi primjenjujemo izmjenično s Falcon®-om i Nativo®-m protiv pepelnice.

Folicur® bez problema možemo miješati sa svim fungicidima protiv peronospre vinove loze.

Datoteke za download

 [Vamostni list 2014](#) [431 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.