



Melody duo WP 66,75

Melody® duo WP 66,75 odlikuje iznimna učinkovitost protiv peronospore vinove loze i plamenjače krumpira. Odlikuje ga dugotrajno sistemsko djelovanje. Unakrsna rezistencija s drugim sredstvima ne postoji. Idealan je fungicid u programima integrirane zaštite bilja.

Sastav iprovalikarb (5,5 %), propineb (61,3 %)

Formulacija močivi prah (WP)

Uporaba

Melody® duo WP 66,75 je kombinirani fungicid za suzbijanje slijedećih biljnih bolesti:

- **plamenjače vinove loze** (peronospora) (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji 0,25 % (250 g sredstva u 100 l vode); ili u količini od 2,5 kg/ha u 1000 l/ha vode;
- **plamenjače na krumpiru** (*Phytophthora infestans*) i **koncentrične pjegavosti na krumpiru** (*Alternaria solani*) u količini od 3 kg/ha (300 g sredstva na 1000 m²);
- **plamenjače na rajčici** (*Phytophthora infestans*) i **koncentrične pjegavosti na rajčici** (*Alternaria solani*) u količini od 2,5 kg/ha ili koncentraciji 0,25 % (250 g u 100 l vode, odnosno 25 g sredstva u 10 l vode).

Prvo tretiranje obavezno treba biti preventivno. Razmaci između tretiranja iznose 10-14 dana ovisno o opasnosti od infekcije.

Priprema sredstva za uporabu

Propisana (odvagnuta) količina preparata izmiješa se sa malo vode te ulije u spremnik prskalice u koji je prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode. Preostalom količinom vode nadopuni se spremnik uz stalno miješanje.

Ograničenja

Na rajčici se može najviše tri puta koristiti u vegetaciji, na vinovoj lozi i krumpiru šest puta.

Fitotoksičnost

Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, preparat Melody® duo WP 66,75 nije fitotoksičan za navedene kulture.

Zaštita okoliša

Melody® duo WP 66,75 ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Kod primjene spriječiti onečišćenje bunara, jezera i vodotokova radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Aviotretiranje

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Miješanje

Ne preporuča se miješanje s EC sredstvima bez prethodne provjere. Ne smije se miješati s propamokarbom, etefonom, diklorvosom, heptenofosom i folijarnim gnojivima. Isključuje fungicidni sinergizam s bakrenim fungicidima.

Karenca

10 dana za rajčicu u zaštićenom prostoru uzgajanoj metodom kišenja, 14 dana za krumpir i rajčicu u polju, 21 dan za stolne sorte grožđa i rajčicu u zaštićenom prostoru uzgojenom hidroponikom i 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Skladištenje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh i prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala, niti eksplozivnih materijala.



Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [360 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.