



Prosaro

Ovaj proizvod možete kupiti uz popust. Za više informacija kliknite na kupon:



Prosaro od samog početka postavlja nove standarde u zaštiti žitarica od biljnih bolesti prije svega u zaštiti od bolesti klasa. Proizvođači koji koriste Prosaro bilježe prinose veće i kvalitetnije od prosjeka.

Sastav protriokonazol (125 g/L), tebukonazol (125 g/L)

Formulacija tekući uljni koncentrat za emulziju (EC)

Uporaba

Prosaro 250 EC je kontaktno-sistemični fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti na:

- **pšenici**, pepelnice (*Blumeria graminis*), hrđe (*Puccinia recondita*), smeđe pjegavosti lista (*Septoria tritici*) i za smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (*Fusarium spp.*) u količini 0,75-1,00 l/ha (75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m²). Za smanjenje zaraze paleži klasa potrebno je obaviti tretiranje višom preporučenom količinom sredstva početkom cvatnje. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
- **ječmu**, pepelnice (*Blumeria graminis*), hrđe (*Puccinia hordei*), sive pjegavosti ječma (*Rhynchosporium secalis*) i mrežaste pjegavosti ječma (*Pyrenophora teres*) u količini 0,75-1,00 l/ha (75-100 ml u 20-40 l vode na 1000 m²). Za suzbijanje sive i mrežaste pjegavosti ječma na osjetljivim sortama treba primijeniti višu preporučenu količinu sredstva. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
- **ozimoj raži**, pepelnice (*Blumeria graminis*), smeđe hrđe (*Puccinia recondita* i *Puccinia hordei*) i sive pjegavosti (*Rhynchosporium secalis*) te za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (*Tapesia spp. sin. Pseudocercospora herpotrichoides*) u količini 1,2 l/ha. Primijeniti najkasnije do mliječne zrelosti zrna preventivno ili odmah nakon pojave prvih simptoma. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini;
- **zobi**, narančaste hrđe (*Puccinia coronata*), pepelnice (*Blumeria graminis*) te za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (*Tapesia spp. sin. Pseudocercospora herpotrichoides*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini i to najkasnije do početka cvatnje.
 - Za suzbijanje narančaste hrđe (*Puccinia coronata*) sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti. U slučaju ponovne zaraze sredstvo se može ponovo primijeniti nakon 2-3 tjedna. Ako se primjenjuje kod uznapredovale zaraze, djelovanje sredstva će biti slabije.
 - Za suzbijanje pepelnice (*Blumeria graminis*) sredstvo se primjenjuje odmah nakon pojave prvih znakova bolesti. Ako pritisak bolesti ostane visok, primjena se može ponoviti.
 - Za smanjenje pojave parazitskog polijeganja (*Tapesia spp. sin. Pseudocercospora herpotrichoides*) tretirati u proljeće odmah nakon pojave znakova bolesti od početka vlatanja do pojave drugog koljenca (BBCH 30-32);
- **uljnoj repici**, suhe truleži korijena i stabljike (*Phoma spp.*), bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) i svjetle pjegavosti (*Pyrenopeziza brassicae*) u količini 1 l/ha. Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini.
 - Za suzbijanje suhe truleži korijena i stabljike (*Phoma spp.*) sredstvo se primjenjuje u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti. Ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate.
 - Za suzbijanje bijele truleži (*Sclerotinia sclerotiorum*) sredstvo se primjenjuje u ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu.
 - Za suzbijanje svjetle pjegavosti (*Pyrenopeziza brassicae*) sredstvo se preventivno primjenjuje u jesen/zimu (obično od kraja listopada do početka prosinca). Naknadno prskanje može biti potrebno u rano proljeće kada počinje izduživanje stabljike, ovisno o razvoju bolesti.

Ograničenje

Može se koristiti najviše dva puta u vegetaciji.

Fitotoksičnost

Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, Prosaro 250 EC nije fitotoksičan za navedene kulture.

Zaštita okoliša

Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje bunara, jezera, vodotokova i mora radom na udaljenosti najmanje 20 m od njih. Ostatak škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Miješanje

Ne preporučuje se miješanje sredstva s kontaktnim herbicidima i mineralnim gnojivima.

Karenca

42 dana za pšenicu i ječam, 56 dana uljana repica. Osigurana je vremenom primjene u ozimoj raži i zobi.

Skladištenje

Sredstvo skladištiti dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži, u zaključanoj prostoriji, izvan dosega djece. Prostor mora biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. U prostoru ne smije biti izvora paljenja (zabranjeno pušenje) i zapaljivih materijala niti eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od -10 ni viša od 40 °C.

Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [385 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.