

LUK iz sjemena

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SJETVE	■ OXALIS 4 - 6 l/ha	jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove
PRIJE SJETVE (uz obavezno unošenje u tlo)	■ DURSBAN G - 7,5 50 - 60 kg/ha tretiranjem cijele površine ili 15 - 20 kg/ha tretiranjem u redove ■ DURSBAN E - 48 6 - 8 l/ha širom ili 2 - 3 l/ha u redove	štetnike u tlu
 KAD LUK DOBIJE PRVE LISTOVE I VOŠTANU PREVLAKU	■ STARANE 250 EC 0,5 l/ha (dvokratna primjena)	širokolisne korove
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 0,75 - 1,0 kg/ha	sivu plijesan, pepelnicu
 POJAVA ŠTETNIKA	■ LASER 0,12 - 0,2 l/ha	kalifornijskog tripsa, duhanovog tripsa, lukovog moljca, sovice
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice, pozemljuša i sovice



NAPOMENA:

Sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u luku najkasnije do 01.07.2014.
POLYRAM DF se može primijenjivati u vlasu na otvorenom u količini 1,2 kg/ha

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

