

SALATA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA	KARENCA
OD NICANJA DO PRESADIVANJA RASADA (do stadija 2 prava lista)	■ POLYRAM DF 0,2 g/m ² u 40 - 60 ml vode/m ²	polijeganje rasada i plamenjaču	OVP
PRIJE PRESADIVANJA	a.t. pendimetalin 4 - 5 l/ha	jednogodišnje travne i neke širokolisne korove	63 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO KOD OPASNOSTI OD POJAVE BOLESTI	■ POLYRAM DF 1,2 kg/ha	plamenjaču	21 dan
	■ CHROMOSUL 80 0,25 - 0,3 % (25 - 30 g u 10 l vode)	pepelnicu	14 dana
U VEGETACIJI, PREVENTIVNO ILI KOD POJAVE PRVIH SIMPTOMA BOLESTI	■ SIGNUM 1 kg/ha	bijelu trulež i sivu plijesan	14 dana
	■ CUPRABLAU Z 0,25 - 0,3 % (25 - 30 g u 10 l vode)	plamenjaču	14 dana
U VEGETACIJI, KOD POJAVE ŠTETNIKA	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisnih uši, lisnih sovića, gusjenica sovića pozemljuša	7 dana
	■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca	7 dana
	■ ALVERDE 1 l/ha	sovicu ipsilon, sovice	3 dana

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi

■ Limacidi

OVDJE ČUVAM JA