

KUKURUZ

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
TRETIRANJE TLA (prije sjetve uz obavezno unošenje u tlo) 	■ DURSBAN G-7,5 50-60 kg širom ili 15-20 kg/ha primjenom u redove 25 kg/ha u vrijeme sjetve u trake širine 15-20 cm ili uz etablirane biljke inkorporacijom u tlo u vrijeme pojave ličinki	zemljišne štetnike: žičnjake, sovice, grčice hrušta i švedsku mušicu kukuruznu zlaticu
	■ DURSBAN E-48 6-8 l/ha širom ili 2-3 l/ha u redove	zemljišne štetnike
OD SJETVE DO 4 LISTA KUKURUZA 	■ DEHERBAN A EXTRA 1-1,2 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove
KOREKTIVNO PRSKANJE (od 3-6 listova kukuruza) 	■ BASAGRAN 480 2 l/ha iii ■ STARANE 250 EC 0,8 l/ha iii ■ LOGO 300 0,2-0,33 l/ha iii ■ KOLO 480 S 0,5-0,7 l/ha iii ■ CAMBIO 2-2,5 l/ha	jednogodišnje širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove jednogodišnje širokolisne korove i smanjuje zakorovljenost nekim višegodišnjim korovima
	■ NICOSH 1,0 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove
	■ NICOSH 1,0 l/ha + ■ KOLO 480 S 0,5-0,7 l/ha iii ■ NICOSH 1,0 l/ha + ■ STARANE 250 EC 0,8 l/ha iii ■ NICOSH 1,0 l/ha + ■ CAMBIO 2-3 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke jednogodišnje širokolisne korove svaka od ovih kombinacija suzbija gotovo sve najvažnije jednogodišnje i višegodišnje korove u kukuruzu
U STADIJU RASTA KADA JE KUKURUZ 1 - 1,2 m VISINE	■ OPERA 1,0-1,5 l/ha	sivu pjegavost lista
PRIJE CVATNJE (do BBCH 59)	■ CHROMOREL - D 0,8 l/ha iii ■ FASTAC 10 EC 0,15 - 0,3 l/ha	gusjenice kukuruznog moljca, gusjenice kukuruzne sovice



NAPOMENA:

- u sušnom proljeću preporuča se prskanje herbicidima prije nicanja uz obaveznu inkorporaciju u tlo na dubinu 2 - 3 cm.
- kombinaciji NICOSHA s drugim herbicidima preporuča se dodavati okvašivač
- sredstvo DURSBAN G-7,5 se smije primjenjivati u kukuruzu najkasnije do 01.07.2014.

■ Herbicidi ■ Fungicidi ■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA