




STRNE ŽITARICE

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
OD POČETKA DO KRAJA BUSANJA 	■ DEHERBAN COMBI - MD 4 l/ha ■ DEHERBAN A EXTRA 1 - 1,2 l/ha	širokolisne korove
OD STADIJA PUNOG BUSANJA DO POJAVE DRUGOG KOLJENCA 	■ LOGO 300 0,3 l/ha ■ BASAGRAN 480 2 l/ha U ranim sortama pšenice, ječma i raži BASAGRAN 480 ne smije se primijeniti u količini većoj od 1,5 l/ha.	širokolisne korove jednogodišnje širokolisne korove
OD POJAVE 3 LISTA DO POJAVE ZASTAVICE 	■ STARANE 250 EC 0,6 - 0,8 l/ha u ozimoj pšenici i ječmu, 0,4 - 0,8 l/ha u jaroj pšenici i ječmu. Za proširenje spektra može se primijeniti: ■ STARANE 250 EC 0,6 l/ha + ■ LOGO 300 0,3 l/ha	širokolisne korove
OD ZAVRŠETKA VLATANJA DO CVATNJE 	■ BUMPER 25 EC 0,5 l/ha ■ DUETT ULTRA 0,4 - 0,6 l/ha	bolesti lista i stabljike
OD POČETKA KLASANJA DO POČETKA CVATNJE 	■ OPERA 1,25 l/ha - iii ■ DUETT ULTRA 0,4 - 0,6 l/ha	bolesti lista i klasa
U VRIJEME POJAVE ŠTETNIKA 	■ RELDAN 40 EC 1,25 - 1,75 l/ha	lemu (žitnog balca) i lisne uši
	■ CHROMOREL - D 0,5 l/ha iii	lisne uši
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	žitnog balca
	■ FASTAC 10 EC 0,12 l/ha	lisne uši kao vektore virusa, zobene lisne uši, ružine lisne uši
	■ FASTAC 10 EC 0,125 l/ha	



NAPOMENA:

- prskanje zobi provodi se s istim herbicidima kao i ječma i pšenice, ali s 20% umanjenim količinama
- količina vode za primjenu kreće se od 200 - 400 l/ha, a za prskanje kontaktim herbicidima 400 - 600 l/ha
- prskanje ječma u jesen kreće od pojave 3. lista

Sredstvo DEHERBAN COMBI - MD se smije primjenjivati u strnim žitaricama najkasnije do 01.04.2014.

Sredstvo RELDAN 40 EC se smije primjenjivati u strnim žitaricama najkasnije do 01.07.2014.

■ Herbicidi ■ Fungicidi ■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA

