




ULJANA REPICA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZIJA
JESENSKO TRETIRANJE (nakon sjetve, a prije nicanja) 	BUTISAN S 1,8 - 2,0 l/ha	uskolisne i neke širokolisne korove
JESENSKO TRETIRANJE (nakon nicanja) 	BUTISAN S 2,0 - 2,5 l/ha ili LOGO 300 0,2 - 0,3 l/ha	uskolisne i neke širokolisne korove širokolisne korove
JESENSKO TRETIRANJE (od stadija kotiledona do oblikovanja rozete) 	FASTAC 10 EC 0,1 l/ha	repičinog buhača, pipu terminalnog pupa
PROLJETNO TRETIRANJE (pred formiranje cvjetnih pupova) 	LOGO 300 0,2 - 0,3 l/ha	širokolisne korove
PROLJETNO TRETIRANJE (pred formiranje cvjetnih pupova) 	CHROMOREL D 0,5 l/ha ili FASTAC 10 EC 0,1 l/ha ili PYRINEX 250 ME 2 l/ha ili RELDAN 40 EC 1,75 l/ha	repičinog sjajnika
	FASTAC 10 EC 0,1 l/ha ili PYRINEX 250 ME 2 l/ha	repičinu pipu komušaricu
	CHROMOREL D 0,5 l/ha	veliku repičinu pipu
	FASTAC 10 EC 0,1 l/ha	repičinu mušicu komušaricu
PROLJETNO TRETIRANJE (u porastu lisne mase i u cvatnji) 	PICTOR 0,3 - 0,5 l/ha	koncentričnu pjegavost komuški i bijelu trulež
PRED ŽETVU (faza 95 prema BBCH skali)	DIQUA 3 l/ha Tretiranje obaviti kada su sjemenke u gornjim komuškama crveno - smeđe do tamno - smeđe. Ne čekati da sve sjemenke sazriju. Tretiranje obaviti u fazi 95 prema BBCH skali.	desikacija uljane repice



NAPOMENA:

Sredstvo RELDAN 40 EC se smije primjenjivati u uljanoj repici najkasnije do 01.07.2014.

■ Herbicidi

■ Fungicidi

■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA