

JAGODA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
PRIJE SADNJE (15 dana)	■ OXALIS 2 - 6 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i uskolisne korove
PRIJE CVATNJE	■ CHROMOSUL 80 3 kg/ha ili ■ STROBY WG 0,03% (30 g na 100 l vode) +	pepelnicu
	■ LASER 0,16 - 0,2 l/ha ili ■ FASTAC 10 EC 0,3 l/ha	kalifornijskog tripsa, <i>Spodoptera littoralis</i> stakleničkog štitastog moljca, duhanovog štitastog moljca
	■ FASTAC 10 EC 0,15 l/ha	lisne uši, gusjenice sovice pozemljuša, sovice
U VEGETACIJI, KOD POJAVE PUŽEVA	■ PUŽOMOR 30 - 40 kg/ha (300 - 400 g na 100 m ²)	štetne puževe
POČETAK I KRAJ CVATNJE	■ SIGNUM 1,5 kg/ha ponoviti SIGNUM za 7 dana - blok metoda	sivu plijesan, pepelnicu
FORMIRANJE PLODOVA	■ SIGNUM 1,5 kg/ha ponoviti SIGNUM za 7 dana - blok metoda	sivu plijesan, pepelnicu



OVDJE ČUVAM JA

