











VIŠNJA I TREŠNJA

ORIJENTACIJSKI PROGRAM ZAŠTITE

VRIJEME PRIMJENE	PRIPRAVAK	SUZBIJA
 MIROVANJE VEGETACIJE	CUPRABLAU Z 0,8% (800 g na 100 l vode)	šupljikavost lista, moniliju i bakterioze
 NABUBRENI PUP	CUPRABLAU Z 0,5% (500 g na 100 l vode) + mineralno ulje	šupljikavost lista, moniliju i bakterioze zimske stadije štetnika
	HERKULES SUPER 4 - 8 l/ha iii OXALIS 3 - 6 l/ha	jednogodišnje i višegodišnje širokolisne i uskolisne korove
 BIJELI PUP	STAR 80 WP 0,2-0,25% (200 - 250 g na 100 l vode) iii CHROMODIN S-65 0,08 - 0,1% (80 - 100 g na 100 l vode)	kožičavost lista
  POČETAK CVATNJE	SIGNUM 0,056 - 0,075% (56 - 75 g na 100 l vode)	moniliju (sušenje rodni grančica), palež cvijeta
  OD POČETKA DO ZAVRŠETKA OPADANJA LATICA	SIGNUM 0,056 - 0,075% (56 - 75 g na 100 l vode)	moniliju (sušenje rodni grančica), palež cvijeta
 FORMIRANJE PLODA	STAR 80 WP 0,20 - 0,25% (200 - 250 g na 100 l vode) iii MERPAN 80 WDG 0,125 ± 0,2 % (125-200 g u 100 l vode)	kožičavost i šupljikavost lista
	CHROMGOR 40 0,05 - 0,075% (50 - 75 ml na 100 l vode) iii	lisne uši i trešnjinu muhu
	RELDAN 40 EC 0,1 - 0,125% (100 - 125 ml na 100 l vode) iii	lisne uši
	FASTAC 10 SC 0,012 - 0,015% (12 - 15 ml na 100 l vode)	
  RAZVOJ PLODA	SIGNUM 0,056 - 0,075% (56 - 75 g na 100 l vode) +	moniliju (trulež ploda)
	CHROMGOR 40 0,05 - 0,075% (50 - 75 ml na 100 l vode)	trešnjinu muhu



NAPOMENA:

Sredstva FASTAC 10 SC i RELDAN 40 EC se smiju primjenjivati u nasadima višanja i trešanja najkasnije do 01.07.2014.
 Sredstvo CHROMGOR 40 se smije primjenjivati u nasadima višanja i trešanja najkasnije do 01.01.2015.

■ Herbicidi
 ■ Fungicidi
 ■ Insekticidi



OVDJE ČUVAM JA